

경고

지카 바이러스 감염증


지카 바이러스 감염증은 대개 모기에 물려 감염되며, 주로 중남미, 카리브해 지역 및 멕시코에서 발생하고 있습니다. 임신한 여성이 지카 바이러스에 감염되는 경우, 선천적 결손증을 가진 아기가 태어날 수 있습니다.



미국에서 남쪽으로 여행

미국으로 돌아오기

	바깥에 있을 때는 환경보호국(EPA)에서 승인한 모기 퇴치 스프레이를 사용합니다.
	모기에 물리지 않도록 소매가 긴 옷과 긴 바지를 착용합니다.
	방충망/모기장 또는 에어컨디션을 켜 놓은 실내에 있거나 방에서 잠을 잡니다.

	여행에서 돌아 온 후 14 일동안은 질병의 징후를 확인합니다.
	여행을 다녀 온 후 발열, 관절통, 근육통, 발진 또는 결막염 증세가 나타나면 의사에게 연락하여 여행 사실을 알립니다.
	현재 임신 중이고 귀하 또는 배우자가 지카 바이러스 감염증이 발생한 지역으로 여행했다면, 증상이 없더라도 의사에게 연락하여 여행 사실을 알리십시오.

여행 관련 최신 정보는 <http://wwwnc.cdc.gov/travel> 을 방문하십시오.

CDCP-ACDC-0081-08 (02/23/16)